






3/1/2023; kartering: SBB_Schoorl_2011; databaseversie: nov 2019; aantal iteraties: 100

Aanpassing indicaties: geen


Aanpassing weegwaarden: geen

Aanpassing vegetatietypen: geen



3/1/2023; kartering: SBB_Schoorl_2011; databaseversie: nov 2019; aantal iteraties: 100

Aanpassing indicaties: geen
Aanpassing weegwaarden: geen
Aanpassing vegetatietypen: geen



3/1/2023; kartering: SBB_Schoorl_2011; databaseversie: nov 2019; aantal iteraties: 100

Aanpassing indicaties: geen
Aanpassing weegwaarden: geen
Aanpassing vegetatietypen: geen





3/1/2023; kartering: SBB_Schoorl_2020; databaseversie: nov 2019; aantal iteraties: 100

Aanpassing indicaties: geen

Aanpassing weegwaarden: geen

Aanpassing vegetatietypen: geen




3/1/2023; kartering: SBB_Schoorl_2020; databaseversie: nov 2019; aantal iteraties: 100

Aanpassing indicaties: geen

Aanpassing weegwaarden: geen

Aanpassing vegetatietypen: geen



GVG (cm t.o.v. maaiveld)

< -10
-10 - 0
0 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 40
40 - 50
> 50
type zonder EIV

3/1/2023; kartering: SBB_Schoorl_2020; databaseversie: nov 2019; aantal iteraties: 100
Aanpassing indicaties: geen
Aanpassing weegwaarden: geen
Aanpassing vegetatietypen: geen

